


## NOS CENTRES DE CONSULTATION



Proximité

Accompagnement

Conseil

## NOS ADRESSES :

### Libourne

5 rue Fimin Didot  
33500 Libourne

### Beychac et Caillau

Impasse de la joncasse  
Lieu-dit Le Barbut  
33750 Beychac et Caillau

### Coutras

13 bis, lieu-dit A l'Atelier  
33230 Coutras

### La Lande de Fronsac

192 ZA L'illot  
33240 La Lande de Fronsac

### St Magne de Castillon

13 avenue du Général de Gaulle  
33350 Saint Magne de Castillon

Membre du Réseau



## PIQÛRES DE FRELONS ABEILLES GUEPES



PRÉVENTION DES  
RISQUES

## Les métiers les plus exposés

- ◇ Apiculteur
- ◇ Agriculteur
- ◇ Pépiniériste, paysagiste, maraîcher
- ◇ Charpentier, couvreur

## Quelle conduite à tenir en cas d'attaque ?

- ◇ Ne pas bouger si très proche
- ◇ Repousser doucement, éviter les gestes brusques
- ◇ S'éloigner, se baisser
- ◇ Se mettre sous l'eau ou à l'abri dans un endroit clos
- ◇ Ne pas s'agiter, ne pas paniquer, les assaillants peuvent poursuivre l'intrus sur plusieurs mètres et abandonner leur poursuite
- ◇ En cas de forte attaque, courir en zig zag déroute les assaillants

## Quelle conduite à tenir en cas de piqûre ?

- ◇ **Rester** calme
- ◇ **Approcher une source de chaleur** immédiatement (briquet, cigarette, eau chaude, sèche cheveux) pour désactiver le venin
- ◇ Si aucune source de chaleur n'est à portée de main, **appliquer** de la glace pour calmer la douleur
- ◇ La guêpe laisse rarement son dard, seule l'abeille le laisse systématiquement et en meurt. Dans ce cas, **retirer** le plus rapidement possible en grattant avec l'ongle mais pas de pince à épiler ce qui ferait éclater la glande à venin.
- ◇ **Laver** à l'eau et au savon puis appliquer un antiseptique
- ◇ **Retirer les bagues** et bracelets si piqûre à la main.
- ◇ **Surélever** le membre piqué
- ◇ **Vérifier votre vaccination**

## Quelles réactions suite à une piqûre ?

### Réaction locale mineure

Douleur, rougeur, durcissement et épaissement de la peau (dure au moins 3-4 heures)

### Réaction toxique

Effet cumulatif de plusieurs piqûres avec signes généraux tels que maux de tête, vomissements, urticaire, oppression thoracique, baisse de la tension artérielle, malaise...

### Réaction allergique

Rougeur, gonflement général, asthme, difficulté respiratoire, sudation, vomissements, possibilité de coma et décès

**Attention, le nombre de piqûres augmente le risque de réaction allergique**



Si connaissance de réaction allergique dans le passé:  
La personne doit avoir en permanence en sa possession un kit d'adrénaline auto-injectable + traitement anti-histaminique et corticoïde par voie orale (sur prescription de son médecin traitant)



### Urgence médicale: Appeler le 15 ou 112

- ◇ Piqûre du visage avec œdème
- ◇ Piqûre à l'intérieur de la bouche
- ◇ Signes généraux: malaise, oppression thoracique, difficultés respiratoires..
- ◇ Antécédent de réactions allergiques graves