

NOS CENTRES DE CONSULTATION



Proximité

Accompagnement

Conseil

NOS ADRESSES :

Libourne

5 rue Fimin Didot
33500 Libourne

Beychac et Caillau

Impasse de la joncasse
Lieu-dit Le Barbut
33750 Beychac et Caillau

Coutras

13 bis, lieu-dit A l'Atelier
33230 Coutras

La Lande de Fronsac

192 ZA L'illot
33240 La Lande de Fronsac

St Magne de Castillon

13 avenue du Général de Gaulle
33350 Saint Magne de Castillon

Membre du Réseau



Contact@sistlib.org



www.sistlib.org

05.57.55.28.00

Nos informations



PIQÛRES DE FRELONS ABEILLES
GUEPES

Les métiers les plus exposés

- ◇ Apiculteur
- ◇ Agriculteur
- ◇ Pépiniériste, paysagiste, maraîcher
- ◇ Charpentier, couvreur

Quelle conduite à tenir en cas d'attaque ?

- ◇ Ne pas bouger si très proche
- ◇ Repousser doucement, éviter les gestes brusques
- ◇ S'éloigner, se baisser
- ◇ Se mettre sous l'eau ou à l'abri dans un endroit clos
- ◇ Ne pas s'agiter, ne pas paniquer, les assaillants peuvent poursuivre l'intrus sur plusieurs mètres et abandonner leur poursuite
- ◇ En cas de forte attaque, courir en zig zag déroute les assaillants

Quelle conduite à tenir en cas de piqûre ?

- ◇ **Rester** calme
- ◇ **Approcher une source de chaleur** immédiatement (briquet, cigarette, eau chaude, sèche cheveux) pour désactiver le venin
- ◇ Si aucune source de chaleur n'est à portée de main, **appliquer** de la glace pour calmer la douleur
- ◇ La guêpe laisse rarement son dard, seule l'abeille le laisse systématiquement et en meurt. Dans ce cas, **retirer** le plus rapidement possible en grattant avec l'ongle mais pas de pince à épiler ce qui ferait éclater la glande à venin.
- ◇ **Laver** à l'eau et au savon puis appliquer un antiseptique
- ◇ **Retirer les bagues** et bracelets si piqûre à la main.
- ◇ **Surélever** le membre piqué
- ◇ **Vérifier votre vaccination**

Quelles réactions suite à une piqûre ?

Réaction locale mineure

Douleur, rougeur, durcissement et épaissement de la peau (dure au moins 3-4 heures)

Réaction toxique

Effet cumulatif de plusieurs piqûres avec signes généraux tels que maux de tête, vomissements, urticaire, oppression thoracique, baisse de la tension artérielle, malaise...

Réaction allergique

Rougeur, gonflement général, asthme, difficulté respiratoire, sudation, vomissements, possibilité de coma et décès

Attention, le nombre de piqûres augmente le risque de réaction allergique



Si connaissance de réaction allergique dans le passé:
La personne doit avoir en permanence en sa possession un kit d'adrénaline auto-injectable + traitement anti-histaminique et corticoïde par voie orale (sur prescription de son médecin traitant)



Urgence médicale: Appeler le 15 ou 112

- ◇ Piqûre du visage avec œdème
- ◇ Piqûre à l'intérieur de la bouche
- ◇ Signes généraux: malaise, oppression thoracique, difficultés respiratoires..
- ◇ Antécédent de réactions allergiques graves